

Laserová operácia

FemtoLASIK

pravé oko ľavé oko

simultánne nesimultánne

pre

krátkozrakosť

ďalekozrakosť

astigmatizmus

Vážená pacientka, vážený pacient,

tento informačný list pre pacientov vypracovaný v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 576/2004 Z. z. slúži spolu s informáciami podanými ošetrojúcim zdravotníckym pracovníkom na to, aby ste správne porozumeli tomu, akým spôsobom prebieha laserové ošetroenie/zárok metódou FemtoLASIK (ďalej aj ako „výkon“ alebo aj ako „chirurgický zárok“). V priebehu úvodného vyšetrenia Vám ošetrojúci zdravotnícky pracovník poskytne všetky informácie o Vašom zdravotnom stave, plánovanom výkone i pooperačnej starostlivosti. Plánovaný výkon s Vami individuálne dohodne a zodpovie Vám na Vaše otázky týkajúce sa výkonu a následnej liečby. Pred úvodným vyšetrením si tento informačný list pre pacienta pozorne prečítajte a dotazník svedomito a pravdivo vyplňte, nakoľko sú súčasťou zdravotnej dokumentácie.

Možnosti liečby

Pri **krátkozrakosti** je očná guľa príliš dlhá, pri **ďalekozrakosti** príliš krátká, takže dopadajúce svetelné lúče nevytvárajú obraz na sietnici.

Pri **rohovkovom astigmatizme** je rohovka v jednej osi viac zvlnená, takže na sietnici vzniká rozmazaný a skreslený obraz.

Tieto dioptrické chyby sa dajú korigovať okuliarmi alebo kontaktnými šošovkami. Ak už kontaktné šošovky netolerujete alebo ak si už neželáte nosiť okuliare, prichádza do úvahy laserová operácia rohovky.

Chirurgický zárok metódou FemtoLASIK, ktorú Vám navrhujeme, je vhodný na korekciu **krátkozrakosti do -8,0 dioptrií (dpt)** (*max. -10,0 dpt), **ďalekozrakosti do +3,0 dpt** (*max. +4,0 dpt) a **astigmatizmu do 5,0 dpt** (*max 6,0 dpt).

Chirurgický zárok metódou FemtoLASIK nedokáže zabrániť vzniku tzv. **presbyopie, čo je potreba používať okuliare na čítanie cca. od 45. roku života**. Vek potreby okuliarov na čítanie je však **individuálny**. Pýtajte sa pri konzultácii, aké sú **vyhliadky na nosenie takýchto okuliarov vo vašom prípade**.

* v závislosti od rohovkových parametrov, veku a individuálnych potrieb pacienta

Ak sa vo Vašom prípade zvažujú aj iné chirurgické metódy, ako napr. refrakčná výmena šošovky, implantácia dodatočnej umelej šošovky (fakickej vnútročnej šošovky) alebo iné typy laserového zároku (napr. PRK), prediskutujeme s Vami ich výhody a nevýhody, priebeh, pooperačný režim, riziká a šance na úspech v porovnaní s metódou FemtoLASIK.

Chirurgický zákrok/výkon

Chirurgický zákrok sa vykonáva v lokálnej anestézii pomocou kvapkovej anestézie. Ak sa majú operovať obidve oči, spravidla sa to uskutoční v rámci jedného sedenia (súčasne) alebo sa druhé oko môže zoperovať aj s odstupom jedného alebo viacerých dní.

Počas výkonu sa viečka držia otvorené pomocou - tzv. rozwierača. Prostredníctvom femtosekundového lasera sa vo vopred vypočítanej hĺbke rohovky, vytvorí tenký lalôčik tzv. flap. Počas práce femtosekundového laseru sa oko sa fixuje pomocou sacieho krúžku. To môže spôsobiť miernu tlakovú bolest a prechodne vidíte iba tmu.

Čiastočne oddelený rohovkový lalôčik (flap) sa zvyčajne odklopí smerom nahor ako stránka knihy. Následne sa **rohovka** v exponovanej oblasti "opracuje" pomocou ďalšieho lasera - excimerového lasera. Tkanivo rohovky, ktoré je potrebné odstrániť, závisí od dioptrickej chyby; čím je vyššia, tým viac rohovky sa musí odstrániť. Vždy sa však dbá na to, aby zostala dostatočne hrubá vrstva rohovky. Po ošetrení sa rohovkový lalôčik (flap) priklopí späť do pôvodnej polohy; nie je potrebné ho zašívať. Podľa potreby sa na oko nasadí krycia kontaktná šošovka, prípadne sa oko prekryje obvazom.

Priebeh uzdravenia/úspech liečby

Účinok anestetických kvapiek pomaly odznieva, približne 30 minút po operačnom zákroku. Následne sa môžu objaviť príznaky ako slzenie, pálenie, tlak, silný pocit cudzieho telesa alebo rezavá bolest, či svetloplachosť, ktoré môžu byť sprevádzané miernym opuchom viečok. Videnie bude ako pod vodnou hladinou, či cez fóliu.

Po niekoľkých hodinách je pacient takmer bez ťažkostí. Dobrá zraková ostrosť sa zvyčajne dosiahne do ďalšieho dňa. Neuspokojivá zraková ostrosť po operácii môže byť spôsobená v dôsledku neštandardného hojenia tkaniva po operácii. Navýše nemožno s určitosťou vylúčiť zhoršenie výsledku do dvoch rokov od chirurgického zákroku/výkonu.

Úspech liečby nie je možné stopercentne zaručiť. Šanca, že po chirurgickom zákroku/výkone metódou FemtoLASIK nebudeste nosiť žiadne okuliare do diaľky je však veľmi vysoká a čím má človek nižšiu krátkozrakosť, tým je táto šanca vyššia. Šance na úspech sú veľmi dobré aj v prípade ďalekozrakosti a astigmatizmu.

Riziká a možné komplikácie

Tieto informácie o rizikách a komplikáciách sú len všeobecným odhadom a majú pomôcť zvážiť riziká. Napriek všetkej starostlivosti môže dôjsť k strate zraku alebo komplikáciám, ktoré si môžu vyžadovať ďalšiu liečbu/operáciu. V zásade sa frekvencia komplikácií zvyšuje s rozsahom potrebnej korekcie a s pridruženými očnými aj celkovými ochoreniami pacienta.

Rana spôsobená rezom sa zvyčajne zhojí počas prvých troch dní. Môže však dôjsť k oneskoreniu hojenia a komplikáciám.

Najčastejšími príznakmi po chirurgickom zákroku je pocit tzv. „suchých očí“ v podobe pocitu cudzieho telesa, tlaku, pálenia alebo zmeny kvality videnia. Zvyčajne to trvá niekoľko dní až týždňov, ale v niektorých prípadoch môže trvať aj niekoľko mesiacov. Tzv. umelé slzy zmierňujú nepríjemné pocity.

V prípade, ak sa obe oči neoperujú súčasne, v čase medzi chirurgickým zákrokom prvého oka a chirurgickým zákrokom druhého oka sa môžu vyskytnúť problémy s binokulárnym videním v dôsledku nerovnosti zrakovej ostrosti oboch očí. Môže sa vyskytnúť dvojité videnie, závraty, či problémy s rovnováhou.

V prvých mesiacoch po chirurgickom zákroku/výkone nie je zriedkavé zvýšené oslnenie a tvorba tzv. haló efektov okolo svetelných zdrojov v tme; tieto poruchy zvyčajne ustúpia samé.

Zriedkavo sa môže stať, že lalôčik rohovky (flap) je príliš malý alebo tenký, prípadne sa môže porušiť vrchná vrstva rohovky (epitel), čo si môže vyžiadať nasadenie kontaktnej šošovky na niekoľko dní alebo indikovanie iného chirurgického zákroku.

V zriedkavých prípadoch môžu bunky hornej vrstvy rohovky (epitelu) prerásť cez okraj flapu a spôsobiť nerovnomernosť rohovky, čím môže dôjsť k zhoršeniu zrakovej ostrosťi, či dyskomfortu v podobe pocitu cudzieho telieska. Ak je postihnutá zraková os, tak sa musia bunky odstrániť pri ďalšom chirurgickom zákroku.

V prípade, ak má rohovkový flap hrubé záhyby – makrostrie, čo je veľmi zriedkavé, flap sa musí vyrovnať a vyhladiť. To isté platí aj pre častejšie sa vyskytujúce drobné záhyby – mikrostrie, ak zhoršujú videnie.

Nedostatočná alebo nadmerná korekcia dioptrickej chyby a suboptimálna centrácia laserového lúča sú zriedkavé. Potom sú potrebné slabšie okuliare alebo iná operácia - dokorekcia.

Zriedkavo v prvých dňoch a podobne aj niekoľko mesiacov po operačnom zákroku môže dôjsť k zápalu rohovky s citlivosťou na svetlo v dôsledku endogénnej (imunologickej) obrannej reakcie, ktorá nie je založená na infekcii (sterilný zápal). Vyžaduje si intenzívnu terapiu kvapkami s obsahom kortizónu. Prepláchnutie flapu rohovky je zriedka potrebné.

Bakteriálne, vírusové alebo plesňové infekcie, ktoré sa nedajú liečiť samotnými liekmi a vyžadujú ďalší chirurgický zákrok, sú veľmi zriedkavé.

Krvácanie do oka, do očných viečok a očnice, krvácanie alebo poškodenie sietnice až po odlúpnutie sietnice vrátane poranenia, infekcie a vedľajšie účinky liekov, ako aj oklúzia ciev sietnice alebo zrakového nervu (napr. v dôsledku tlaku sacieho krúžku) sú extrémne zriedkavé a môžu si vyžadovať ďalšie operácie.

Všetky tieto komplikácie, ako aj zjazvenie rohovky, ktoré je dôsledkom predispozície k zvýšenej tvorbe jaziev či keloidov (napr. v dôsledku infekcií alebo sprievodných ochorení, ako sú rôzne systémové ochorenia), môžu viesť k trvalému poškodeniu zraku, v krajinom prípade až k strate zraku.

Veľmi zriedkavo, krátko po operačnom zákroku, ale aj po rokoch, vedie dedičná slabosť tkaniva k vydutiu rohovky, tzv. ektázii, čo výrazne zhoršuje videnie. V závislosti od stupňa vydutia sú potrebné ďalšie zákroky (napr. tzv. corneal cross-linking alebo ako posledná možnosť môže byť potrebná transplantácia rohovky)

Zvýšenie očného tlaku po podaní kortizónových kvapiek môže vyžadovať dočasného potrebu liečby kvapkami na zníženie očného tlaku.

Technické poruchy použitých nástrojov (napr. zlyhanie lasera) sú nepravdepodobné, ale nemožno ich vylúčiť a môžu viesť k neadekvátnym výsledkom operačného zákroku. Poruchy femtosekundového lasera alebo sacieho krúžku môžu spôsobiť nepresnosti rezu a môžu viesť k predčasnému ukončeniu chirurgického zákroku.

Alergia/intolerancia (napr. na latex, lieky), ktorá nebola pacientovi ani lekárovi vopred známa, veľmi zriedkavo vedie k akútнемu obeholému šoku, ktorý si vyžaduje intenzívnu starostlivosť. Veľmi zriedkavé sú závažné reakcie, trvalé poškodenie (napr. orgánové zlyhanie, poškodenie mozgu, paralýza).

Na všetko, čo je pre Vás dôležité alebo čo je Vám nejasné, sa opýtajte ošetrujúceho lekára.

Prosím dbajte na dodržiavanie pokynov lekára a ošetrujúceho personálu!

Pred chirurgickým zákrokom:

Týždeň pred vyšetrením resp. operáciou nenosiť **mäkké kontaktné šošovky**. **Tvrde kontaktné šošovky** nenosiť minimálne dva týždne.

V deň operácie: by pacient nemal mať príznaky akútneho respiračného či iného ochorenia, žiadne make-up, či umelé riasy, a nemal by používať mastné krémy na pokožku v okolí očí.

Po chirurgickom zákroku:

Počas prvých hodín majte obidve oči prevažne zatvorené a počas prvých dní si operované oko/oči netrite. Približne týždeň po absolvovaní operačného zákroku sa vyhýbajte fyzickej námahe, tri týždne saune, soláriu, kozmetickým úpravám v okolí očí a plávaniu.

Pravidelne užívajte predpísané lieky (napr. očné kvapky, gely). Noste slnečné okuliare dovtedy, pokiaľ sa budete cítiť svetlopachosť. Počas prvého týždňa nepoužívajte očný make-up. Pri sprchovaní alebo kúpaní dbajte na to, aby sa Vám nedostala do očí voda. V deň operácie nefajčíte, pretože to môže spôsobiť pálenie očí. Pri vykonávaní nebezpečných prác (napr. brúsenie) neste vždy ochranné okuliare.

Dodržiavajte dohodnuté termíny kontrolných vyšetrení a pri bolestiach, zhoršujúcim sa začervenaní operovaného oka, akútnej poruche videnia nás ihneď kontaktujte, prípadne vyhľadajte najbližšiu očnú pohotovosť. Informujte nás o zvýšenej citlivosti na svetlo 4-8 týždňov po laserovej operácii.

Zákrok sa vykonáva ambulantne a bude Vás musieť vyzdvihnúť dospelá osoba, pretože Vaša schopnosť reagovať môže byť stále znížená anestetikami, sedatívmi a/alebo liekmi proti bolesti ako aj prekrytím očí. Prvých 24 hodín po zákroku, resp. dovtedy, kým máte zhoršené videnie, sa nesmiete aktívne zapájať do premávky, vykonávať nebezpečné činnosti a pracovať na bežiacich strojoch. Počas prvých 24 hodín nepite žiadnen alkohol a omamné látky, nerobte žiadne dôležité rozhodnutia a nefajčíte. Liečba stáže presné meranie vnútroočného tlaku a výpočet šošovky pred operáciou sivého zákalu. Preto prosím informujte očného lekára pre neskorších ošetreniach o tejto laserovej operácii.

Alternativne refrakčné výkony pri FemtoLASIK:

- TE PRK
- LASIK
- ReLEx SMILE
- Z-LASIK
- CLEAR

Predpokladaný vývoj zdravotného stavu bez zákroku – zachovanie refrakčnej chyby optického systému oka.

Dotazník (anamnéza)

Prosíme, odpovedzte pozorne na nasledujúce otázky, aby sme mohli lepšie predchádzať akýmkoľvek rizikám. Zakrúžkujte alebo doplňte podľa potreby. V prípade potreby vám ho pomôžeme vyplniť.

(A – áno / N – nie)

Meno, priezvisko a adresa pacienta: _____

Vek: _____ rokov

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| 1. Užívate pravidelne lieky (napr. lieky proti bolesti, antikoaguláciá (napr. aspirín), lieky na spanie, laxatíva, kortizón)?
Pokiaľ áno, uvedťte ktoré:

_____ | A N | 5. Máte implantovaný kardiostimulátor alebo umelú srdcovú chlopňu?
_____ | A N |
| 2. Máte alergie (napr. sennú nádchu, astmu) alebo intoleranciu (napr. plasty, lieky proti bolesti/sedatíva, narkotiká, iné lieky, potraviny, náplasti, latex, jód, silikónový kortizón)?
Pokiaľ áno, uvedťte ktoré:

_____ | A N | 6. Máte ochorenie orgánov (napr. pečeň (napr. zápal, funkčné poškodenie, žľcové kamene) obličky (napr. dialýza, obličkové kamene))?
Pokiaľ áno, uvedťte ktoré:
_____ | A N |
| 3. Máte poruchu zrážalivosti krvi alebo zvýšený sklon ku krvácaniu (napr. časté krvácanie z nosa, sklon k tvorbe modrín, modriny bez zvláštneho dôvodu)?
Pokiaľ áno, uvedťte ktoré:
_____ | A N | 7. Máte metabolické ochorenie (napríklad cukrovka, ochorenie štítnej žľazy/prištítnych teliesok)?
Pokiaľ áno, uvedťte ktoré:
_____ | A N |
| 4. Máte ochorenie srdca, krvného obehu alebo ciev (napr. arytmia, srdcové zlyhanie, myokarditída, angina pectoris, srdcový infarkt, vysoký krvný tlak, nízky krvný tlak, dýchavičnosť pri chodení do schodov)?
Pokiaľ áno, uvedťte ktoré:
_____ | A N | 8. Máte tendenciu k nadmernej tvorbe jaziev (keloidov)?
_____ | A N |
| | | 9. Vyskytuju sa u vás infekcie?
_____ | A N |
| | | 10. Máte ochorenie reumatického typu (napr. kĺbový reumatizmus, sklerodermia, lupus erythematosus)?
Pokiaľ áno, uvedťte ktoré:
_____ | A N |
| | | 11. Doplňujúce otázky pre ženy vo fertilnom veku:
Mohli by ste byť tehotná?
Dojčite?
_____ | A N |

Dokumentácia o poskytnutí informovaného súhlasu

Poznámky lekára _____ k informovaniu pacienta
(meno lekára)

Diskutovalo sa najmä o: Cieľ (zdôvodnenie) chirurgického zákroku, voľba a realizácia chirurgického zákroku, výhody a nevýhody oproti iným metódam, riziká a možné komplikácie, zvláštnosti zvyšujúce riziko, možné sekundárne a následné zákroky, vyhliadky na úspech, návod ako sa správať pred a po zákroku, náklady na zákrok a pod.

Plánuje sa nasledujúci chirurgický zákrok: laserové ošetrenie metódou

- FemtoLASIK
- Pravé oko Ľavé oko
 Simultánne Nesimultánne
 Pre Krátkozrakosť Pre Ďalekozrakosť
 Pre Astigmatizmus

Plánovaný termín zákroku (dátum): _____

INFORMOVANÝ SÚHLAS

Prečítal/-a som si informačný list pacienta a porozumel/-a som mu. Na konzultácii som sa mohol/mohla opýtať na akékoľvek otázky, ktoré ma zaujímali. Boli zodpovedané úplne a zrozumiteľne. Som dostatočne informovaný/-á, svoje rozhodnutie som si dôkladne premyslel/-a a nepotrebujem ďalší čas na rozmyslenie. V rámci písomných a ústnych informácií som bol/-a oboznámený/-á aj s účelom predmetného chirurgického zákroku, s jeho priebehom a prípadnými alternatívami. V tejto súvislosti som bol/-a oboznámený/-á s kladmi a zápormi predmetného chirurgického zákroku, ako aj s kladmi a zápormi alternatívnych chirurgických zákrokov. Ďalej som bol/-a poučený/-á o rizikách, ktoré môžu počas, po či v súvislosti s chirurgickým zákrokom nastať a aj s obmedzeniami mojich osobných či pracovných aktivít v priebehu a po absolvovaní chirurgického zákroku. Vyhlásujem a svojim podpisom zároveň potvrdzujem, že zdravotnícky pracovník, ktorý mi poskytol poučenie, mi osobne vysvetlil všetko, čo je obsahom písomných informácií o chirurgickom zákroku. Vyhlásujem, že som písomnému a ústnemu poučenie porozumel/-a a **výslovne súhlasím s vykonaním vyšie uvedeného chirurgického zákroku.** Zároveň vyhlásujem, že beriem na vedomie, že priaznivý výsledok chirurgického zákroku nemožno garantovať. Rovnako vyhlásujem, že v prípade výskytu neočakávaných komplikácií vyžadujúcich neodkladné vykonanie ďalších výkonov potrebných k záchrane môjho života alebo zdravia, súhlasím s tým, aby boli vykonané všetky ostatné potrebné a neodkladné výkony smerujúce k záchrane môjho života alebo zdravia. Bol/-a som poučený/-á o rozsahu a o výške úhrady za poskytnuté výkony a s výškou súhlasím. Dotazník som vyplnil/-a podľa môjho najlepších vedomostí. Budem dodržiavať odporúčania.

Miesto, dátum, čas

Pacientka/pacient

Lekárka/lekár

Odmietnutie

Miesto, dátum, čas

Pacientka/pacient

Lekárka/lekár